Rigolbonilli

Vass4R01s541-545

0Mtp967

Richard St.

Collection Vassal-Montpellier

Rigolbonilli 8 R 10 s. 86.90









DESIGNATION: Rigolborrilli CLOS & PLANCHE NO RANG Souche 86.90 Vigueur : PORT : érig - 2 érig - couché Fillerandage: 0,5 28.7.86 Date de Véraison : Date de Maturité : Pourriture : 0 16 <u>GRAPPE</u> : G - (N) - P : L - H - C BAIE : TG - (6)- H - P 21-21 disc. - Spb. - ell. - Ov. obov - cyl. - fus. COULTUR : Gr - Gr - Rs - H SAVEUR : m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 6 s20 avec pépins - apyrène 830 JUS inc. - coloré

CLOS 8 RANG 10 Souche 86-90 Désignation : Rigolbonilli Année : CHARGE : 25.7 Véraison : 22.8.88 Maturité : Mill.: 0 Pour.: () GRAPPE : G -(M)- P - Dim. : 16 Vigueur: 2,5 PORT : érig - (1/2) érig - couché) Année : TG - G - M - P - Dim. : 20 4 19 disc -sph. -ell. fov. -obov. -cyl. -fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N. SAVEUR : s - (m) ar - fox - herb. s1 5 Avec pépins - apyrène s2 3 JUS inc. - coloré 33 2 34 5

année: 1986 Emplacement... 3. R.10. s. 86.a. 90. Désignation. Rigolbenilli...

The state of the s	Nombre Fotal	DATES									
ž.		243	1 28,3 1	# #	1.	1	!				
1 2 8		the fire date	<u> </u>	1	1 1	1 1	i				
2 4		E	1 <u>1</u> 1	1	1	1 1	î				
1 4	4	1 1	! 2 x !	1	1	1 1	1				
5	5	A		1	1	1					

D le 28.3.86 +3

DESIGNATION: Rigol-bonilli Date de la vendange : 9 -9 86 (+3) Poids de la vendange : 3400 Date de Dégustation : 5.1,87 (2129) Wombre de souches : 4 hombre de grappes : 16 OBSERVATIONS : Classe : 2, 1 Pourriture : 16/0 Couleur : Rose en Blanc Indice refract. : 19,4 (109) Acidité du moût : 4,3 Deawer Date: 159
Persité: 1996 Date: 16.4

Nise en bouteille

Densité: 996 1. 25 Degré alcoolique : M, 1 Acidité du vin

NOM Rigolbonilli 15

EMPLACEMENT 8 RAO & 86. 90

Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité	Flo début	raison mi/f			raison mi/v		Maturité
1 2 3 4 5	5	27-3 21-3 27-3 31-3	3.4 31.3 3.4	2 4 2 7 1		4,6	9,6	,(6,6	27.7	30-7	3.48	<b>8</b> ,9 t3
	20		£.9 +6	16	8		9.5				V	enige

NOM Rigolbonilli 11

EMPLACEMENT 8 Rio 186.90

Souche Nbre Débourrement Nbre Ferti- Floraison début mi/déb grap lité début mi/f fin début mi/v fin Maturité

1 5. 213 253 3
3 3 213 255 2 9 315 3 6 66 25.1. 28.7 4.8 22.8

4 4 25.3 5
5 4 9 27.3 25.3 5
7 Pourriture : 6 Port : militie vique viqueur : 25 mayeume +1

25.3 +1

NOM Rigolbonilli

EMPLACEMENT 8 R101 86.90

ouche	Nbre yeux		mI/deb		Ferti- lité		raison mi/f		Vé début	raison mi/v		Maturité
1 2 3 4 5	44464			12144	5,4	24.5 24.5 22.5 24.5	24.5	305	17.7	247	1,8	
Po	urrite	re · 2	20%	Mill.	: 0	Port	: Mui	erig	Z.	Vigue	ur :	3

DESIGNATION : EMPLACEMENT : Rigolbonilli cl 8 R 10 2 - 86, 90 (p. 37)

## (A) BOURGEONNEMENT

#### Colonne

41 - épanoui () - moyen 2 - globuleux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0-fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 6 - autre 9.

#### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées () - en gouttière (8) - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses (7)duveteuses 8) cotonneuses 9.
- 44 blanches0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Rigolbonilli Cles 8 R. 100. 86-90 (5.87)

Désignation : Emplacement :

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 - Nervures : glabre O- séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - de duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 6 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement () sillon 2 partiellement 3.

# (F) RAMEAU HERFACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 6.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

#### (I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3. 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5. Rigolbonilli clos 8 R 10 s-86-90 (s.87)

Désignation : Emplacement :

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.
subcontinues 5 - intermittentes 6.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 - longue 4 - très longue 5.

#### (I) FLEUR

morphologiquement : male 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvost

Rigolbonilli.

Désignation : Emplacement : ·clos 8 R 10 s. 86-90 (090)

#### FEUILLE ADULTE

## Colonne

34 - petite 1 - moyenne ()- grande 3.

Face supérioure : limbe et nervures : glabre (2) séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure . <u>Aervures</u> : glabre 4 - séteux 5)- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbr : glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: plan 1 - on gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté (5)

lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (Vertourmenté 5.

36 - Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 moyennement bullée (7) - grossièrement bullée 4 gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérioure : verte ( point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. Cest edorées au foint fétislaire

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - ontièrement rouge 4.

Coulour: vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - autro 5.

#### PETIOLE

39 - long ()- moyen ()- court 3.

39 - glabre () - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement ()

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - particllement coloré (2) - autre 3.

Calvo85

Rigolbonilli 8 Rro 1-86-90 3-90 N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

#### GRAPPE

Prosse 68 - Moyenne (69) - Petite 70 (dimensions : 16x ). Lache 71 - Moyenne 72 - Compacte (13) A padoncule non visible 74 - visible 75 - long 76. A rédoncule herbacé 77 - mi-aoûté (78) - aoûté jusqu'à la première ramification 79. Ara de la rafle celeré 80 - non coloré (81)

#### BAIE

Très grosse 82 - Grosse (83) - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions : 21 x 21). De couleur blanc m- gris 88 - rose (89) - rouge 90 - noir 91. Très pruinée 92 - prainée (93) - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïda 95 - sphéroïde (96) - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - anquée 103 - autres 104. A jus incolore (05 - colore 106. A ombilic très apparent - geu apparent. A saction transversale : régulière (07) - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 1(1). A saveur neutre 🕼 - fade 113 - musquée ಭ - aromatique 115 - foxée 116 horbacie 117 - spiciale 118. De séparation facile (égreneuse) - difficile. is pédicelle long 110 - moyen (20) - court 121. A pédicelle de coulcur : verte [2] - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelat de couleur verte (25 - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évidenc 128 - peu apparent (29). A pinceau : court 139 - moyen (3) - long 132. a pinceau : coloré 133 - non coloré 134 A peau fine 135 - moyenne 166) - épaisse 137. A pulpe charmie 138 - juteuse (39 - molle 140 - peu juteuse. avec pepins - apyrene.

# Formulaire de description 5/8 (maturité)

Observateur: Lecombe Année 1998 t'ode cepage Code clone Emplacement 8 Rios 86.96 Nom cépage : Kigoltonille 4RAS41-545 Grappe oiv 202 longueur : très courte (<10cm) 1 - courte (10-15cm)(3)- moyenne (15-20cm) 5 - longue +20-30cm) 7 - très longue (>30cm) 9. oiv 203 largeur: très étroite (<5cm) 1 - étroite (5-10cm) 3- moyenne (10-15cm) 5 - large (15-20cm) 7 - très large (>20cm) 9. 20cm) 7 - très large (>20cm) 9. oiv 204 compacité: très lâche 1 - lâche 3 - moyenne 5 - compacte 7 - très compacte 9 oiv 206 longueur pédoncule : très court (<2cm) 1 - court (2-4cm)(3)- moyen (4-7cm) 5 - long (7-10cm) 7 - très long (>10cm) 9. oiv 207 **lignification du pédoncule** : base seulement (1 - moitié) 5 - plus de la moitié 7 oiv 208\* forme : cylindrique 1 - conique ou pyramidale 2) oiy 209\* présence d'un aileron : absent 1) une aile 2 - deux ailes 3 - plus de deux ailes 4. Baie bity 220 longueur: tres courte (<8min) 1 - courte (8-14min) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - longue 21 (20-26mm) (2) très longue (>26mm) 9. oiv 221 largeur : très étroite (<8mm) 1 - étroite (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5- large (20-!onum) 7 - très large (>26mm) 9. oiv 222 uniformité de la grosseur : non uniforme T) - uniforme 3 ny 223 forme aplatie 1 - arrondie 2 - elliptique(3)- ovoide 4 - troncovoide 5 - obovoide 6 ylindrique 7 - arquée 8. oiv <u>225</u> couleur épiderme : vert jaune 1 - rose② - rouge 3 - gris 4 - rouge violet 5 - bleu noir 6. oiv 226 uniformité couleur épiderme : non uniforme 1 - uniforme 2 oiv 227 pruine nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 228 épaisseur pellicule : très mince 1 - mince 3 - moyenne 5 - épaisse 7 tres épaisse 9 oiv 229 **ombilic** : peu apparent (1) apparent 2. of 230\* coloration de la pulpe : non colored D colorec 2. oiv 231 intensité coloration pulpe non coloree 12 coloration faible 3 - coloration moyenne 5 torte coloration 7 - très forte coloration 9. oiv 232 succulence pulpe : peu juteuse 1 - juteuse 2 oiv 233 rendement en jus (ml / 100g baies) : faible (505) 3 - moyen (05-75) 5 élevé (>75) 7 oiv 235 fermeté pulpe : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5) élevée 7 - très élevée 9. biv 236 saveur aucune 1 - goût muscat@- goût foxé 3 - goût herbacé 4 - goût spécial 5. biy 236\* saveur: aucune 1 - goût muscat@- goût foxe 3 - autre 4. oiv 238 longueur pédicelle : très court (<4mm) 1 - court (4-8mm/3) moyen (8-12mm) 5 - long (12-16mm) 7 - très long (>16mm) 9. oiv 240 séparation du pédicelle : très facile 1 - facile 3 - moyen 5 - difficile 7 - très difficile 9. ony 241 présence de pépins : absents type corinthien 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présents 3 oiv 242 longueur pépins : très courts 1 - courts 3 - moyens 5 - longs 7 - très longs 9 OIV 243 poids d'un pépin (moyenne de 100 pépins secs) très faible (+10mg) 1 - faible (25mg) 3 moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (~65mg) 9 oiv 244 cannelures transversales face dorsale pépins absentes () présentes 2

Vassal grappe axe de la rafle : non coloré (81)- coloré 80.

Rigolbonille 7 × 10.186.90 (2.87) DENOMINATION : EMPLACEMENT :

#### SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) -cotonneux (9).

entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface

: blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus fonce (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron fonce (5) - brun rouge (6) violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effice(2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calus 80

Nº d'ordre : Désignation : Rigolbonille Emplacement: 8R105.86.90 Angle des nervures Sexe L1/L2

L2/L : 12 - 13 - 14 - 15 - 16 Nombre de lobes

: 17 - 18 - 19 - 20 Prof. sinus latéral Sup. : 21 - 22 - 23 - 24 Prof. sinus latéral Inf. : 25 - 26 - 27 - 28 - 29 Forme sinus pétiolaire

Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 : 267 Sinus pétiolaire ouvert Dent au fond du sinus pétiolaire : 30

Forme sinus-lateral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- 39

: 1 -(2) - 3

: 4 - 5 - 6

: (7) - 8 - 9

: (10) - (11)

Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270

Sinus latéral Supérieur ouvert : 271

: 40 - (41) Dents : forme

: (42) - (43) - 44 Dents (angle) : (15) - (16) - (17) Angle du lobe terminal

Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50

Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59

: (60) - 61 - 62 Angle des nervures L3 L'3

: 63 - 64 - 65 - 66 - 67 Largeur du sinus pétiolaire

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües